

Ritka pszichiátriai szindrómák

Prof. Dr.Tényi Tamás

Pécsi Tudományegyetem, Pszichiátriai
és Pszichoterápiás Klinika

Elméleti vonatkozások

- Tünet vagy szindróma? – spektrum szemlélet
- Specifikus pszichodinamika
 - Ekbom szindróma – tárgyvesztés
 - Capgras szindróma – ambivalencia
 - Cotard szindróma – halállal kapcsolatos egzisztenciális szorongás

Elméleti vonatkozások

- Organikus és/vagy pszichodinamikus háttér helyes súlyozása
- Ritka kórképek és idegtudományi vonatkozások – az arcfelismerés fodori moduláris modellje és a kóros identifikációs kórképek (Ellis, Young, 1990)
- „content specific disorders” – jobbféltekei érintettség strukturális és funkcionális vizsgálatokkal (Enoch, Ball, 2001)
- pimozyd, riszperidon

Monoszimptómás hypochondriás pszichózis (Munro 1988)

- Sajátság téboly (Enoch, Ball, 2001 magyarul Pethő és mtsai, 1979)
- Ekbom szindróma
- Deluzív diszmorfofóbia

Ekbom szindróma

- Ekbom, svéd neurológus után, aki 1937-ben leírta a kórkép jellemzőit
- DSM-IV-TR: deluzív zavar szomatikus típus és/vagy taktilis hallucinózis (organikus hallucinózis)
- Dunn és mtsai (2007): szenzoriális teória vagy kognitív teória
- 10000 pszichiátriai beutalásból 7 (Marneros et al, 1988)
- Tünetként jelenhet meg funkcionális pszichózisokban és vaszkuláris demenciában
- Deluzív cleptoparasitosis (Grace, Kenneth 1987) – Morgellons betegség
- Tárgyvesztések után gyakoribb (Hárdi 1988, Tényi et al, 1993)
- Terápia: pimozid, riszperidon, olanzapin, paroxetin, fluoxetin
- Bhatia et al (2013): amisulpride, quetiapine, aripiprazole, paliperidone, iloperidone

Tamás Tényi
Mátyás Trixler

Department of Psychiatry and
Medical Psychology, Medical
University School of Pécs,
Hungary

Coexistence of the Delusions of Infestation and Body Smell in Schizophrenia: A Case Report

.....

Abstract

The coexistence of the delusions of infestation and of body smell is reported. In the analysis of a schizophrenic patient, the authors suppose a connection between object loss and the formation of secondary symptoms. Delusions of infestation and/or body smell can be an indication for a careful psychological analysis in schizophrenia.

.....

Ekbom szindróma

- Wolf et al., Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2013, 46 19-24
- MRI és voxel-alapú morfometriás vizsgálat, 16 beteg és 16 illesztett kontroll
- 6 deluzív zavar, 3 pszichotikus depresszió, 7 organikus pszichotikus zavar
- Kisebb szürkeállomány volumenek a betegek esetében a bal oldali mediális, laterális és a jobb oldali superior frontális régiókban, a bal oldali anterior cinguláris kortexben, mindkét oldali inzula esetén, bal oldali thalamus, jobb oldali striatum területén és a jobb oldali temporalis lebeny területén.

Deluzív kóros identifikációs kórképek (Murai et al, 1988, Vörös, Tényi et al, 2001)

- Capgras típus – hasonmás téboly – negatív kóros identifikáció (Vie, 1930)
- Frégoli típus – pozitív kóros identifikáció (Vie, 1930)
- Klonális pluralizáció – reduplikatív paramnesia (Arnold Pick, 1903)

‘Clonal Pluralization of the Self’: A New Form of Delusional Misidentification Syndrome

Viktor Vörös · Tamás Tényi · Mária Simon · Mátyás Trixler

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Faculty of Medicine, University of Pécs, Pécs, Hungary

Key Words

Delusional misidentification syndromes · Capgras symptom · Reduplicative paramnesia · Clonal pluralization · Schizophrenia

syndromes defined as ‘classic’ DMS, i.e. Capgras delusion [4–6], Frégoli delusion [7], intermetamorphosis delusion [8] and the delusion of subjective doubles [9] the ‘subjective’ and ‘reverse’ types of these DMS were characterized

Capgras jelenség

- Tünet lehet funkcionális (70%) és organikus pszichózisokban, önálló szindróma paranoid paranoid pszichózis formájában
- Az organikus esetek jobbféltekei frontális és temporális léziók következményei
- Elkülönítendő a prosopagnosiától, amely hasonló tüneti képet mutat, ott nincs téveszmés feldolgozás
- Violencia veszély!!
- A funkcionális pszichózisokban jelentkező esetekben az ambivalens tárgyakapcsolatok meghatározóak, amely hasításhoz vezet.

Capgras jelenség

- Salvatore et al., Psychopathology, 2014 47, 261-269
- 517 első epizódos pszichotikus zavar miatt hospitalizált beteg esetében a Capgras jelenség prevalenciájának meghatározása
- 73 (14,1%) beteg esetében jelent meg a Capgras jelenség

1991. augusztus, VI. évf. 3. sz. 243-247. o.

A CAPGRAS-TÜNET SZKIZOFRÉN PSZICHÓZISOKBAN

Tényi Tamás dr., Trixler Mátyás dr.
POTE, Pszichiátriai Klinika, Pécs

Összefoglalás

A szerzők dolgozatukban a Capgras-szindrómát szenvedő betegek esetében a jelenség pszichotikus jellegét elemzik. A szindróma tüneti és személyiség-pszichológiai vonatkozásait vizsgálják. A szindróma kialakulásában a depersonalizációs folyamatok szerepét vizsgálják. A szindróma kialakulásában a depersonalizációs folyamatok szerepét vizsgálják. A szindróma kialakulásában a depersonalizációs folyamatok szerepét vizsgálják.

Proceedings of the 8th International Conference on Literature and Psychoanalysis: 197-199

The Capgras-Delusion in Fiction: Dimensions of Interpretation

TAMÁS TÉNYI (*)

«Identity is not found but made — ficted.»
Norman Holland

There is a constant interest on the appearance of the Capgras delusion. In his book, Tymms (1949) examined the mythological origins of the delusion to myths and legends whose central motif is impersonation. The delusion is richly endowed with accounts of the hallucinatory double. This suggests that in modern times, the idea of doubles and ir-

1992. október, VII. évf. 5. szám, 457-466. o.

A CAPGRAS-JELENSÉGRŐL

Tényi Tamás dr., Trixler Mátyás dr.
POTE Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika

Összefoglalás

A szerzők áttekintő tanulmányukban a Capgras-szindrómát szenvedő betegek esetében a jelenség pszichotikus jellegét elemzik. A szindróma tüneti és személyiség-pszichológiai vonatkozásait vizsgálják. A szindróma kialakulásában a depersonalizációs folyamatok szerepét vizsgálják. A szindróma kialakulásában a depersonalizációs folyamatok szerepét vizsgálják.

Summary

The authors in a review article, analyse the nosological, clinical and etiopathogenetical aspects of Capgras-phe-

Frégoli jelenség

- Courbol és Fail írta le 1927-ben, Leopoldo Frégoli színész után
- Leggyakrabban szkizofréniában és szkizoaffektív pszichózisban, gyakran posztpartum pszichózisban
- Bruce, Ellis, Young arcfelismerési modellje:
 - a.) strukturális kódolás
 - b.) arcfelismerő egység – Capgras
 - c.) személyazonosító csomópontok - Frégoli

FRÉGOLI-TÜNET ÉS SZEXUÁLIS MAGATARTÁS – A KOGNITÍV NEUROPSZICHOLÓGIA MEGKÖZELÍTÉSE

Tényi Tamás, Ábrahám Ildikó, Trixler Mátyás, Lénárd Kata

POTE Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika, Pécs

Összefoglalás

A szerzők esettanulmányukban egy szkizoaffektív pszichózisban megjelenő Frégoli-tünet esetét ismertetik. Az eset elemzése során az arcfelismeréssel és a személyazonosítással kapcsolatos jelenleg legelterjedtebb kognitív neuropszichológiai modellt követik. Rámutatnak, hogy a személyazonosító csomópontok szintjére patológiás esetekben a kórosan azonosított személyek szexuális magatartása folyamatosan patoplasztikus hatást gyakorolhat.

Kulcsszavak: Frégoli – téveszme – kognitív neuropszichológia – arcfelismerés

Summary

Frégoli-delusion involves the belief that a familiar person disguises himself or herself as others. The authors report a case of Frégoli-delusion where the development of the symptom was rooted in the misidentified person's sexual behaviour. The authors give a detailed case report of a patient treated with the diagnosis of schizoaffective psychosis. They interpret their case in the light of recent results of face recognition and use the most frequently cited modular model of Bruce, Ellis and Young (5). First in literature they demonstrate that in psychosis the person identity nodes stage of face recognition can be continuously deranged by the misidentified person's sexual behaviour.

Key words: Frégoli – delusion – delusional misidentification – cognitive neuropsychology – sexual behavior

De Clérambault szindróma

- Erotomán típus (DSM-IV-TR) – primer forma
- Tünetként szkizofréniában, bipoláris zavarban, mentális retardációban, organikus pszichoszindrómákban – szekunder forma
- „Szenvedélytéboly” (De Clérambault, 1942)
- Társulhat Capgras vagy Frégoli jelenséggel vagy indukált paranoid zavarral
- Szexuális konfliktusok, nárcisztikus deficit!!
- Violencia veszély!!
- Pszichoterápia, pimozyd, risperidon

Othello szindróma

- Féltékenységi típus (DSM-IV-TR)
- Kraepelin, Langfeldt írta le először
- 8134 pszichiátriai beutalásból 93 esetben áll fenn (Soyka et al,1990)
- Pszichodinamika: látens homoszexualitás, ödipális konfliktusok (Enoch,Ball,2001)
- Szexuális diszfunkciók (erektilis diszfunkció) az esetek felében, kétharmadában fordulnak elő (Enoch,Ball,2001) – alkohol szerepe !!

Couvade szindróma

- Tylor írja le 1865-ben, de már Francis Bacon is említi 1627-ben
- Leggyakrabban szomatoform tünetek a terhes nő férjénél – couvade szindróma
- Bogren 81 terhes nőt és férjét vizsgálta és 20%-ban talált couvade szindrómát (legalább két tünet)
- Identifikációs-introjekciós mechanizmusok központiak
- Rituális couvade: a férj tudatosan imitálja a terhes nő tüneteit, panaszait, hogy távoltartsa a gonosz szellemeket – Borneóban a férj rizst eszik és nem ehets galambot
- Pszichotikus couvade (Tényi és mtsai, 1996)

.....

Psychotic Couvade: 2 Case Reports

Tamás Tényi^a, Mátyás Trixler^a, Ferenc Jádi^b

^a Department of Psychiatry and Medical Psychology, University Medical School of Pécs, Hungary

^b Hochschule der Künste, Berlin, Germany

Abstract

Couvade is a phenomenon, where the expectant father or another relative experiences somatic and/or psychiatric symptoms during a woman's pregnancy. Although epidemiological studies report a frequency of couvade symptoms between 11 and 36% during all pregnancies, psychotic couvade cases are very rare with few case reports. The authors report 2 cases of psychotic couvade and give a psychodynamic interpretation of the cases. They emphasize the important role of ego defect and double identification in the development of the cases.

A couvade-szindróma

TÉNYI TAMÁS DR. TRINIER MATYÁS DR.

POTE Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika közleménye.

Definíció és klinikai vonatkozások

Couvade-szindrómán a terhes nő férjénél vagy ritkán hozzátartozójánál, gyermekénél kialakult pszichogenetikusan determinált pszichiátriai tünetek vagy azok társulását értjük. A couvade-szindróma leggyakrabban a terhes anya férjénél jelentkezik, a klinikai képet leggyakrabban kimutatható organikus háttér nélkül fellépő szomatoform szimptómák uralják. Ritkábban a pszichoszomatikus spektrumba illesztett tünet (fejfájás), vagy szorongásos, igen ritkán paranoid vagy szkizofreniform tünetek alkotják [1,6].

Szomatikus tünetek leggyakrabban a fogfájás, fejfájás, hátfájás, meteorizmus, obstipáció, hasmenés, étvágycsökkenés vagy fokozódás, súlynövekedés, fájdalmak, álterhesség, ételek megkívánása, hányinger, hányás. Bár a couvade kifejezést először Tylor használja 1865-ben, a férjénél a feleség terhessége során fellépő testi változásokat

Cotard jelenség

- 1880-ban írja le Jules Cotard – nihilisztikus téveszme
- Egyes esetekben tünetként jelentkezik más esetekben szindróma
- Cotard I: tiszta nihilisztikus téveszme – tünet
- Cotard II: szorongás, depresszió, halhatatlansággal kapcsolatos téveszmék, auditoros hallucinációk, nihilisztikus téveszmék, szuicid magatartás – szindróma (Berrios, Luque, 1995)
- Funkcionális pszichózisokban, szomatikus betegségek és organikus pszichoszindrómák keretében fordulhat elő
- International Study of Psychotic Symptoms in Schizophrenia ausztriai adatainak (N:346) elemzése során három esetben (0,87%) jelent meg a Cotard tünet (Stompe, Schanda, Neuropsychiatr 2014, 27, 38-46)

Cotard jelenség

- Neuropszichológiai vizsgálatok jobbféltekei parietális és temporális érintettséget írtak le
- Társulhat Capgras szindrómával, szekvenciális kibomlást is leírtak (Young, 1994)
- Pszichodinamika: büntudat, a test-szelf átélésének zavara, deperszonalizáció, tudattalan halálvágy
- Terápia: pszichoterápia, antipszichotikumok, antidepresszívumok

A COTARD-JELENSÉGRŐL

NAGY ÁGNES, VÖRÖS VIKTOR, TÉNYI TAMÁS

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

ÖSSZEFOGLALÁS

Bevezetés és célkitűzés. Közleményünk célja, hogy átfogóan bemutassuk a hazánkban eddig még részletesen nem tárgyalt Cotard-jelenséget, kiemelve a legújabb kutatási eredményeket főként az etiológia és neuropszichológia területén. A Cotard-tünet központi eleme a nihilisztikus téveseszme, miszerint a páciens maga, illetve a világ, amiben él, nem létezik.

Módszer. Részletes irodalmi áttekintés az internetes tudományos adatbázisok alapján, a releváns cikkek feldolgozása, valamint klinikai eseteink bemutatása.

Eredmények. A fentiek alapján a Cotard-tüneten történeti áttekintése, a terminológia, a nozológia,

ABOUT THE COTARD'S SYNDROME

Introduction, aims. The authors present the Cotard's syndrome, a rare psychiatric condition, pointing out the latest results in terms of etiology and psychoneurology. The central feature of the syndrome is a nihilistic delusion, in which the patient denies his or her own existence and that of the external world.

Method. We searched electronic databases using the appropriate search terms, relevant articles were carefully reviewed. We present three cases from our clinical practice.

Results. After the overview of the latest biological and neuropsychological findings, the historical aspects of the condition, the terminology, the

Terhességi téveszme férfi beteg esetében

- Férfiak esetében bizarr téveszme
- Leírták szkizofréniában, affektív pszichózisban, paranoid zavarban, epilepsziában, paralysis progressivában és más demenciákban is
- Organikus tényezők (kognitív deficit, demencia, alacsonyabb IQ), pszichotikus tünetek (cönesztopátia, egyéb percepciós zavarok) és hasi szenzációk téveszmés interpretációja állnak a háttérben („magzatmozgás téveszmeje”)

Coexistence of Delusions of Pregnancy and Infestation in a Male

Tamás Tényi · Róbert Herold · Sándor Fekete · Attila Kovács · Mátyás Trixler

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical Faculty, University of Pécs, Hungary

Key Words

Delusion of pregnancy in male · Posttraumatic epilepsy ·
Delusion of infestation · Organic psychiatry · Psychosis

Abstract

The coexistent appearance of delusions of pregnancy and infestation is reported in a male patient with posttraumatic epilepsy. While published organic cases of

Delusions of infestation have been reported mostly in monosymptomatic hypochondriacal psychosis, although reports do exist on the appearance of these delusions in schizophrenia, affective disorders and dementias too [16–19]. Previously, we described a case of a schizophrenic female patient in whom a rare coexistence of delusions of body smell and infestation was presented [20]. In this paper, we report a case of a patient with posttraumatic epilepsy. In the interictal phase of epilepsy, a schizopre-

Démonikus megszállottság

- A babonás, mágikus rontással kapcsolatos hiedelmek befolyásoltatásos téveszmék esetében patoplasztikus hatásúak – a befolyás kívülről jön !!!
- A démonikus megszállottság ennek egy ritkább formája: a beteg azt gondolja, hogy benne egy démon lakik, a szájával beszél, a végtagjait mozgatja (Lhermitte, 1943, Aubin, 1950) – befolyás belülről jön !!!
- Ismert a jelenség „pszeudo” formája is: a beteg bűnösségi érzéseit, szentségtörő gondolatait azzal magyarázza, hogy egy démon műveli ezt benne
- Freud (1923) : Christoph Haiztmann festő megszállottságát elemzi – negatív ödipális viszonyt hangsúlyozza
- Fairbairn (1943), Guntrip (1971) : „rossz anya-reprezentáns projekciója”

1992. április, VII. évf. 2. sz. 167-173. o.

A MÁGIKUS BEFOLYÁSOLTSÁG ÉS A DÉMONIKUS MEGSZÁLLOTTSÁG PSZICHOPATOLÓGIAI VONATKOZÁSAIRÓL CIGÁNYOK SZKIZOFRÉN PSZICHÓZISAIBAN

Tényi Tamás dr., Trixler Mátyás dr.

POTE, Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika, Pécs

Összefoglalás

A szerzők dolgozatukban olyan cigány betegek szkizofrén pszichózisait tanulmányozzák, ahol mágikus befolyásoltsággal és démonikus megszállottsággal kapcsolatos tartalmakat találtak. A vizsgált populáció kulturális sajátosságait a cigány betegek szkizofrén pszichózisában patoplasztikusnak tartják. A mágikus befolyásoltsággal kapcsolatos téveszmék etnopszichiátriai és mélylélektani elemzését nyújtják. Utalnak a vizsgált jelenségek pszichoterápiás jelentőségére is.

Summary

The authors study schizophrenic psychoses among Gypsies, where delusions in connection with magical influence and demoniacal possession appeared. The cultural specialities of the observed population is supposed to play pathoplastic role in their schizophrenic psychoses. The authors present ethnopsychiatric and psychoanalytical examination of the delusions, which are connected to magical influence. The study mentions the psychotherapeutic importance of the observed phenomena.

„Computer scatologia”

- Telefon scatologia
- „Internet Regression” (Norman Holland)
- Cybersex – Cyberhate
- Genderbending

Anorexia Nervosa Following Sexual Harassment on the Internet: A Case Report

Ágnes Gáti,^{1*} Tamás Tényi,¹ Ferenc Túry,² and Márta Wildmann²

¹ Department of Psychiatry and Medical Psychology, University of Pécs,
Medical Faculty, Pécs, Hungary

² Department of Psychiatry, County Hospital of Miskolc,
Eating Disorders Setting, Miskolc, Hungary

Accepted 7 May 2001

Abstract: Background: Sexual abuse may be a risk factor for the development of anorexia nervosa. No information is available on sexual abuse through the Internet and its connection to the development of eating disorders. **Method:** We report on a case of an adolescent female with the diagnosis of anorexia nervosa, whose symptomatology correlated significantly with an incident of sexual harassment experienced via the Internet. **Results:** A case of on-line harassment suffered without off-line follow-up is reported to have led to a restrictive type of anorexia nervosa, where the symptomatology was connected to a "computer scatology" like persecution of our patient. **Discussion:** A causal connection of the on-line sexual harassment suffered and development of eating disorder is reported. © 2002 by Wiley Periodicals, Inc. *Int J Eat Disord* 31: 474–477, 2002.

Key words: anorexia nervosa; sexual harassment; Internet

Indukált paranoid zavar

- Lasegue és Falret írja le 1877-ben „Folie a deux”
- Domináns beteg – szubmisszív recipiens
- Genetikai (testvérek, szülő-gyermek) vagy nem genetikai kapcsolatok (házastársak)
- Gralnick (1942) 103 eset áttekintése alapján 4 alcsoportot ad meg:
 1. Folie imposée – szeparálás után megszűnik
 2. Folie simultanée – párhuzamosan, indukció nélkül alakul ki ugyanaz a téveszme
 3. Folie communiquée – indukált tünet, amely a szeparálás után nem szűnik meg
 4. Folie induite – az indukált beteg továbbbontja és új téveszmét alakít ki az átvett doxasmából

CASE REPORT

Coexistence of *folie communiquée* and *folie simultanée*

TAMÁS TÉNYI, ANIKÓ SOMOGYI, EDINA HAMVAS, RÓBERT HEROLD,
VIKTOR VÖRÖS & MÁTYÁS TRIXLER

Department of Psychiatry and Psychotherapy, Faculty of Medicine, University of Pécs, Pécs, Hungary

Abstract

Objective. The authors report a case during which they observed serious subtypes of induced delusional psychosis (*folie communiquée* and *folie simultanée*) without any common genetic background or premorbid psychosis in the case of the secondary patient. **Method.** The clinical phenomenology of the case is described. **Results.** Mild intellectual disability and environmental–psychological factors (social isolation and the symbiotic-like interpersonal relatedness) play an essential aetiological role in the case of the secondary recipient patient. **Conclusion.** The authors emphasize the importance of subclassification of induced delusional psychosis for further aetiological and clinical research.

Key Words: *Induced delusional psychosis, folie a deux, folie communiquée, folie simultanée, shared paranoid psychosis, subclassification of folie a deux*

„Horrorfilm neurózis”

- „Exorcist fever” – 1970-es években – Newsweek
- Bozzutto: „Cinematic neurosis following the Exorcist” J Nerv Ment Dis, 1975, 161, 43-48
- Ballon, Leszcz: „Horror films: tales to master terror or shapers of trauma?” Am J Psychotherapy, 2007, 61, 211-230
- A horrorfilm a szeparációval, vesztéssel, autonómiahiánnyal kapcsolatos szorongások kezelésében játszhat szerepet, de éretlen identifikációs mechanizmusok esetén kórnemző szerepe is lehet

K. 34.103

DER FALL DER ADOLESZENTEN IDENTITAETSKRIZE HERVORGERUFEN DURCH DEN FILM »Der EXORZIST«

THE CASE OF THE CRISIS OF ADOLESCENT IDENTITY INDUCED BY THE MOVIE »EXORCIST«

T. Tényi & Cs. N. Csizyné

Zusammenfassung: Die Autoren behandeln den Fall eines adoleszenten Mädchens, bei dem sich, nachdem sie den Film mit dem Titel »Der Exorzist« gesehen hatte, ein Zustand ernster Ängstlichkeit und Schlaflosigkeit entwickelte. Die Analyse dieses Falles zeigte eine Identitätskrise, die durch den Film aktiviert wurde. Das Hauptproblem des Patienten war eine Ambivalenz in der Objektbeziehung, so dass die Verbindung zwischen ihrer Angst vor einer demonischen Besessenheit und ihrer Identitätskrise von wirtschaftlichen, dynamischen und strukturellen Gesichtspunkten betrachtet worden ist. Ein besonderes Interesse ist der Aktivierung von »bösen« internen Objekten, im Prozess der Symptombildung, gewidmet worden.

Summary: The authors deal with a case of an adolescent girl, who developed a state of serious anxiety and insomnia, after watching the movie, titled the »Exorcist«. The analysis of the case showed the crisis of identity, which was activated by the movie. The main problem of the patient was her ambivalence in object-relating, so the relation between her fear of demoniacal possession and her identity crisis has been analysed from economical, dynamical and structural points. Special interest is given to the activation of »bad« internal objects, in the process of symptom-formation.

Sažetak: Autori obrađuju slučaj adolescentne djevojke kod koje se razvilo stanje ozbiljne tjeskobe i nesanicе nakon što je gledala film s naslovom »Eksorcist«. Analiza slučaja pokazala je krizu identiteta koja je nastala kao posljedica filma. Glavni problem pacijenta bio je dvoznačnost u povezivanju objekata tako da je njen strah od demonske opsjednutosti bio analiziran s ekonomskih, dinamičkih i strukturalnih stajališta. Posebna pažnja pridodata je aktiviranju »zlih« internih objekata u procesu formiranja simptoma.

Truman Show téveszme

- Megváltozottság élmény
- Kóros jelentőség tulajdonítás
- Értelem keresés
- Truman tünet

Truman Show téveszme

- Fusar-Poli P., Howes O., Valmaggia L., McGuire P. (2008), 'Truman' signs and vulnerability to psychosis. The British Journal of Psychiatry 167-168.
- Gold J., Gold I. (2012) The "Truman Show" delusion: Psychosis in the global village. Cognitive Neuropsychiatry. 17(6):455-72.
- Madeira L., Bonoldi I., Rocchetti M., Brandizzi M., Samson C., Azis M., Queen B., Bossong M., Allen P., Howes O., McGuire P., Fusar-Poli P. (2016) Prevalence and implications of Truman symptoms in subjects at ultra high clinical risk for psychosis, Psychiatry Res. 30;238:270-6

Egyéb ritka jelenségek

- Ganser szindróma (melléválaszolás, érzékcsalódások, fluktuáló tudatborulás, konverziós tünetek)
- Münchausen szindróma (pszichológiai tünetekkel, fizikális tünetekkel, mindkét tünettől)
- „Munchausen syndrome by proxy” (Meadow 1977)
- Kolhaas szindróma” – perlekedési téboly
- Charles-Bonnet szindróma (szenzoros depriváció - hallucinosis) – vizuális vagy zenei hallucinációk

Coexistent Acquired Hearing Loss and Right Fronto-Parietal Meningioma as Causes of Musical Hallucinations

Tamás Tényi, MD, PhD,¹ Péter Móricz, MD,²
János Stefanits, MD,³ Péter Barsi, MD, PhD,⁴ and
József Janszky, MD, PhD³

Although etiological theories on musical hallucinations tend to focus on single factors, this article reports the case of a patient with coexistent factors that might be relevant in aberrant musical listening. A 61-year-old woman with symptoms of anxiety was examined in an outpatient psychiatric center. During the examination, musical hallucinations were explored. Severe hearing loss, including loss in her right ear and mild loss in her left ear, was found. The magnetic resonance scan exhibited a right-sided fronto-parietal meningioma. In lieu of the presenting clinical picture, where the

presence of simple partial seizures was considered a possibility, carbamazepine treatment and later a low-dose risperidone add-on medication were introduced. This report emphasizes the importance of assessing the interactive potential of coexistent pathogenetic factors. Such factors might take an active presence, especially when considered in the context of evaluating musical hallucinations.

Keywords: musical hallucinations; meningioma; hearing loss; epilepsy

Case Reports

Musical Hallucinations Successfully Treated with Antipsychotic Medications: Three Case Reports


David Mansoor, MD, Linda Ganzini, MD, MPH

Many people have had the experience of a jingle or ditty that they are unable to get out of their head. For some, these perceptions worsen in intensity to become a hallucination. Musical hallucinations occur in individuals with and without mental illness. Compared with a song

ior and low mood over the preceding 6 months after the unexpected death of his daughter. He was diagnosed with severe major depressive disorder with psychotic features. During the subsequent 10-day psychiatric inpatient hospitalization, he was prescribed citalopram



Egyéb ritka jelenségek

- Koro jelenség(a pénisz eltűnésével kapcsolatos szorongás vagy téveszme)
- Amok (India)
- Whitigo (Észak-Amerika- szörny általi elnyeletés)
- Piblokto (eszkimók között – pszichomotoros nyugtalanság)



Ritka pszichiátriai tünetek és szindrómák

TÉNYI TAMÁS



- Köszönöm a figyelmet !!!